

## FICHA TÉCNICA

# Agro Met 600

metamidofos

Insecticida organofosforado / concentrado emulsionable

Metamidofos  
Concentrado emulsionable

### COMPOSICIÓN

Metamidofos no menos de 48.3%

### REGISTRO COFEPRIS:

RSCO-INAC-0144-311-009-048

### FUNCIÓN

**AGROMET 600** es un insecticida de aplicación directa a la planta o foliar, recomendada para el combate y control de insectos plagas en los cultivos que aquí se indican. Está formulado como concentrado emulsionable y actúa por contacto e ingestión.

### ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
Apariencia	Líquido homogéneo
Color	Transparente
Olor	Característico
Densidad (g/ml)	1.22 +/- 0.01

### USO EN CULTIVOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*
Algodonero	Araña Roja ( <i>Tetranychus cinnabarinus</i> )	1.0-2.0	5
	Gusano Falso Medidor ( <i>Trichoplusia ni</i> )	1.0-1.5	
	Chinche Lygus ( <i>Lygus</i> )	1.0	
		0.75-1.0	

	<p><b>lineolaris)</b>  Pulgón del Algodón (<b>Aphis gossypii</b>)  Chinche Rápida (<b>Creontiades rubrinervis</b>)  Pulga Saltona (<b>Psallus seriatus</b>)  Pulga Saltona Negra (<b>Spanagonicus albofasciatus</b>)  Chinche Machacadora (<b>Dysdercus spp</b>)  Conchuela (<b>Chlorochroa ligata</b>)  Conchuela Verde (<b>Nezara viridula</b>)  Gusano Peludo (<b>Stigmene acraea</b>)  Gusano Soldado (<b>Spodoptera exigua</b>)  Mosquita Blanca (<b>Bermisia tabaco</b>)  Trips (<b>Frankliniella spp</b>)  Gusano Medidor De Algodón (<b>Alabama argillacea</b>)</p>		
Col	<p>Chinche Arlequin (<b>Murgantia histrionica</b>)</p>	1.0	35
Col de Bruselas Coliflor Brócoli	<p>Gusano del Corazón de la Col (<b>Copitarsia consueta</b>)  Gusano Falso Medidor (<b>Trichoplusia ni</b>)  Pulga Saltona (<b>Phyllotetra spp</b>)  Palomilla Dorso De Diamante (<b>Plutella xylostella</b>)  Gusano Soldado (<b>Spodoptera exigua</b>)  Pulgón de la Col (<b>Brevycorine</b>)</p>	<p>1.0  1.0-1.5  1.0-1.5</p>	35

	<b>brassicae)</b> Mariposita Blanca ( <b>Pieris rapae</b> )		
Berenjena	Araña Roja ( <b>Tetranychidae</b> ) Gusano del Fruto ( <b>Heliothis zea</b> ) Gusano Falso Medidor ( <b>Trichoplusia ni</b> ) Gusano Soldado ( <b>Spodoptera exigua</b> ) Pulgón Myzus ( <b>Myzus persicae</b> )	1.0 1.0-1.5 1.0	14
Chile	Araña Roja ( <b>Tetranychus spp</b> ) Gusano del Fruto ( <b>Heliothis zea</b> ) Gusano Falso Medidor ( <b>Trichoplusia ni</b> ) Gusano Soldado ( <b>Spodoptera exigua</b> ) Chicharritas ( <b>Eutettix tenellus</b> ) Diabrotica ( <b>Diabrotica spp</b> ) Minador de la Hoja ( <b>Liriomyza spp</b> ) Mosquita Blanca ( <b>Trialeurodes spp</b> ) Pulgon Myzus ( <b>Myzus persicae</b> )	1.0-1.5 1.0 1.0-1.5 1.0	14
Jitomate	Araña Roja ( <b>Tetranychus cinnabarinus</b> ) Gusano del Fruto ( <b>Heliothis zea</b> ) Minador de la Hoja ( <b>Liriomyza vaporariorum</b> ) Mosquita Blanca ( <b>Trialeurodes vaporariorum</b> ) Pulga Saltona ( <b>Epitrix spp</b> ) Pulgón Myzus ( <b>Myzus</b> )	1.0-1.5 1.0 1.0-1.5 0.75-10 1.0-1.5 1.0	0

	<p><b>persicae)</b>  Chicharritas (<b>Eutettix spp</b>)  Chinche Pequeña Del Tomate  (<b>Dicyphus minimus</b>)  Chinche Brincadora  (<b>Diabrotica variegata</b>)  Diabrotica (<b>Manduca sexta</b>)  Gusano del Cuerno  (<b>Trichoplusia ni</b>)  Gusano Falso Medidor  (<b>Spodoptera exigua</b>)  Trips (<b>Frankliniella spp</b>)  Pulgones (<b>Aphididae</b>)</p>		
Lechuga	<p>Gusano Falso Medidor  (<b>Trichoplusia ni</b>)  Gusano Soldado (<b>Spodoptera exigua</b>)  Pulgón Myzus (<b>Myzus persicae</b>)</p>	1.0	14
Papa	<p>Catarinita de la Papa (<b>L. decemlineata</b>)  Pulga Saltona (<b>Epitrix cucumeris</b>)  Pulgón (<b>Macrosiphum solafinoli</b>)  Pulgón Myzus (<b>Myzus persicae</b>)  Chicharritas (<b>Empoasca spp</b>)  Gusano Falso Medidor  (<b>Trichoplusia ni</b>)  Gusano Soldado (<b>Spodoptera exigua</b>)  Mosquita Blanca  (<b>Trialeurodes vaporarium</b>)  Palomilla de la Papa  (<b>Phthorimaea operculella</b>)</p>	<p>1.0-1.5   1.5  1.0-1.5</p>	14
Melón	<p>Araña Roja (<b>Oligonychus</b></p>	1.0-1.5	1

	<b>mexicanus)</b>		
Pepino Sandía	Barrenador del Fruto <b>(Diaphania spp)</b> Chicharritas <b>(Empoasca spp)</b> Diabrotica <b>(Diabrotica spp)</b> Gusano Del Fruto <b>(Heliothis zea)</b> Gusano Falso Medidor <b>(Trichoplusia ni)</b> Gusano Peludo <b>(Estigmene acraea)</b> Gusano Soldado <b>(Spodoptera exigua)</b> Minador De La Hoja <b>(Liriomyza spp)</b> Mosquita Blanca <b>(Bermisia tabaci)</b> Pulga Saltona <b>(Epitrix spp)</b> Pulgón Del Melón <b>(Aphis gossypii)</b>	1.0-1.5 1.0-1.5	1
Ornamentales	Mosquita Blanca <b>(Aleyrodidae)</b> Gusano De La Hoja <b>(Varias especies de Lepidoptera)</b>	125 mL/100 L	1

## MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

**AGROMET 600** está formulado en forma e concentrado emulsionable, para aplicarse debe disolverse la dosis recomendada de productos en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme del follaje de las plantas tratadas. Para cultivos bajos y equipo de aplicación terrestre, emplear de 200 a 400 L de agua por hectárea aproximadamente, y si la aplicación es con equipo aéreo emplear de 60 a 80 L de agua por hectárea.

## INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezclar con agentes oxidantes, materiales alcalinos, acero al carbón y aleaciones de cobre. Es inestable en pH alcalino.

## **MANEJO DE RESISTENCIA**

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.