FICHA TÉCNICA

Agrocin 20
cipermetrina
insecticida agrícola - concentrado emulsionable

Cipermetrina
Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN
Cipermetrina no menos de 19.60%

REGISTRO COFEPRIS:
RSCO-INAC-0111-356-009-020

FUNCIÓN
AGROCIN 20 es insecticida piretroide a base de cipermetrina que actúa por contacto e ingestión principalmente sobre larva de lepidópteros, dípteros y otras plagas.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
Apariencia	Líquido homogéneo sin partículas extrañas
Color	Amarillo- ámbar
Densidad (g/ml)	1.0+/-0.1

USO EN CULTIVOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)
Algodonero (30) *	Gusano Bellotero ***(Heliothis Zea, Heliothis Virescens)*** Perforador de la Hoja ***(Bucculatrix Thurberiella)***	400-600 ml
Soya (7) *	Gusano Rosado ***(Pecctinophora Gossypiella)*** Falso Medidor ***(Trichoplusia Ni)*** Gusano Soldado ***(Spodoptera Spp)*** Gusano de la Hoja ***(Alabama Argillacea)*** Chinche Lygus ***(Lygus Spp)***	400-600 ml
	Gusano Bellotero ***(Heliothis Zea)*** Gusano Terciopelo ***(Anticarsia***	300-500 ml

	Gemmatalis) Gusano Peludo ***(Estigmene Acraea)***	
Maíz (1) *	Gusano Cogollero ***(Spodoptera Frugiperda)***	300-500 ml

(*) Días entre la última aplicación y cosecha

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN Y APLICACIÓN

AGROCIN 20 puede usarse en aplicación terrestre y aérea. La cantidad de agua dependerá según el tipo de aplicación. Terrestre: Aplicar de 200-600 L de agua por hectárea, utilizando equipo convencional. Es muy importante que para determinar nuevas aplicaciones se realicen muestreos de la población de insectos y considerar los indicadores necesarios y la etapa de desarrollo del cultivo. Aplicar temprano en la mañana o por la tarde cuando las temperaturas no sean altas.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No debe ser mezclado con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá realizarse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.