

FICHA TÉCNICA



Atrazina
Suspensión acuosa

COMPOSICIÓN

Atrazina no menos de 45%

REGISTRO COFEPRIS

RSCO-HEDE-0204-308-008-045

FUNCIÓN

ATRANEX 50 S.C. es un herbicida selectivo sistémico y residual, con uso en preemergencia y postemergencia para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo y caña de azúcar. Controla malezas de hoja ancha y algunas gramíneas impidiendo su crecimiento durante varios meses.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
Apariencia	Líquido cremoso
Color	Blanco-beige
Densidad	1.1+/-0.1
Solubilidad	Soluble en agua

USO EN CULTIVOS

CULTIVO	MALEZA QUE CONTROLA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Sorgo	Cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)	1.5-4.0	Postemergente: aplique la dosis mínima después de que haya emergido la maleza, pero antes de que alcance los 4 cm
	Muela de Caballo (<i>Brachinaria spp.</i>)	2.0-2.5	
	Zacate de Ano (<i>Panicum fasciculatum</i>)		
Maíz	Zacate Azul (<i>Poa anua</i>)		Preemergente: donde predominen los
	Cola de Zorra (<i>Setaria spp.</i>)	1.5-4.0	
	Cola de Ardilla (<i>Eragrostis</i>)		

	<p>mexicana) Quelite (<i>Amaranthus spp.</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleraceae</i>) Golondrina (<i>Euphorbia spp.</i>) Correhuela (<i>Ipomoea spp.</i>) Girasol (<i>Heliantus annus</i>) Malva (<i>Malva spp.</i>) Lengua de Pájaro (<i>Polygonum aviculare</i>) Bolsa de Pastor (<i>Capsella bursa pastoris</i>) Acahualillo (<i>Bidens pliosa</i>) Calabacilla (<i>Sycios angulata</i>) Toloache (<i>Datura stramonium</i>)</p>	2.0-2.5	<p>zacates se debe aumentar la dosis y aplicar en preemergencia debido a los zacates. Aplicar después de la siembra y antes de la germinación del cultivo.</p> <p>Postemergente: aplique la dosis mínima después de que haya emergido la maleza, pero antes de que alcance los 4 cm.</p>
Caña de azúcar	<p>Acahual (<i>Simixia amplexicaullis</i>) Quelite Cenizo (<i>Chenopodium álbum</i>) Quelite Bledo, Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Quelite De Puerco (<i>Chenopodium rostratum</i>) Rosilla Chica (<i>Gallinsoga parviflora</i>) Mala Mujer (<i>Solanum rostratum</i>) Mostaza (<i>Brassica campestris</i>) Chayotillo (<i>Sycius angulatus</i>) Zacate de Agua (<i>Echinochloa colonum</i>)</p>	2.0-2.5	<p>Postemergencia: aplicar inmediatamente después de la plantación o siembra</p>

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llene con agua hasta la mitad de su capacidad el tanque del aspersor. En un recipiente aparte y en poca agua, diluya la cantidad de herbicida a utilizar, mezclando vigorosamente hasta formar un lechado. Agregue esta lechada al tanque del aspersor agitando continuamente, agregue finalmente al tanque agua y mantenga la suspensión en agitación.

CONTRAINDICACIONES

Cuando el cultivo en rotación sea diferente a los mencionados anteriormente, no deberá aplicarse más de 2.5 L/ha.

FITOTOXICIDAD

ATRANEX 50 S.C. no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezclar **ATRANEX 50 S.C.** con otros plaguicidas, a excepción de los siguiente: METOLACLOR, GLIFOSATO, ALACLOR, SIMAZINA Y VERMOLATO.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.