

## FICHA TÉCNICA

# Citocor MAXX®

Nutriente Vegetal

### ANÁLISIS GARANTIZADO

Magnesio (Mg)	0.60%
Fierro (Fe)	0.48%
Zinc (Zn)	0.64%
Manganeso (Mn)	0.32%
Cobre (Cu)	0.20%
Boro (B)	0.08%
Molibdeno (Mo)	0.008%
Cobalto (Co)	0.004%
Giberelinas	50 ppm
Citocinina	50 ppm
Tiamina	1000 ppm
Ácido Indolbutírico	500 ppm
Ácido Naftalenacético	200 ppm
Ácidos Fúlvicos	6.00 %

### REGISTRO

RSCO: RSCO-034/IV/04

### INFORMACIÓN GENERAL

**Citocor MAXX®** es un bioestimulante para desarrollo vegetal.

**Citocor MAXX®** es un fertilizante foliar con micronutrientes cuya acción estimula el metabolismo vegetal.

### Recomendaciones de uso

CULTIVO	DOSIS RIEGO mL/ha	APLICACIÓN
Algodón	500	Inicio de cuadro y 3 a 4 semanas después.
Acelga, espinaca, ajo, lechuga, coles, brócoli y cebolla	450-500	2 a 5 pares de hojas y 5 a 10 días después.
Papaya	250 cada 30	Inicio al comenzar la floración.

	días	
Fresa	400-500	Inicio de la floración y repetir cada 3 a 4 semanas.
Tomate, berenjena, chile, leguminosas y cucurbitáceas	450-500	Al inicio de la floración y repetir a la aparición de los frutos.
Granos y cereales	450-500	Inicio de macollamiento. Segundo nudo (maíz y sorgo)
Frutales caducifolios	2 L/1,000 L de agua	Inicio de la floración y a las 3 o 4 semanas
Banano	250 cada mes	En siembras nuevas iniciar la aplicación a los 40 días de la emergencia de las plantas
Vid	1 – 1.5 ml/litro de agua	Aplicar al inicio de la brotación, cuando éstos tienen alrededor de 10 cm de longitud.
Ornamentales	100mL/100 L de agua	10 a 20 de altura y 3 a 4 semanas después.
Tabaco	500	A los 30 a 45 días del trasplante y repetir si el caso fue alto
Piña	250mL/100L de agua	A los 30 a 45 días del trasplante y repetir a los 60 a 90 días. Después de la caída de la flor y repetir cada 21 días.
Mango, aguacate, naranja, toronja, mandarina, limón	450-500	Dos semanas después del inicio de la floración hasta la caída de los pétalos.
Papa, camote y betabel	500	Inicio de formación de tubérculo y repetir a los 15 a 30 días.
Alfalfa	450-500	Aplicar cuando la planta tenga 10 a 15 cm de altura y 15 a 20 hojas después de cada corte.
Caña de azúcar	500	Cuando las plantas tengan 40 a 50 cm de altura.
Tratamiento de semillas	600mL/Ton de semilla	Antes de la siembra.

## **MÉTODOS DE APLICACIÓN**

**Citocor MAXX®** puede ser aplicado al suelo o vía foliar empleando mochila de mano, de motor, motobomba, etc. En aplicaciones al suelo puede ser a través de sistemas de riego tecnificado.

## **COMPATIBILIDAD**

**Citocor MAXX®** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común y fertilizantes foliares. Es siempre recomendable realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos.

## **AVISO DE GARANTÍA**

**Fertilizantes e Hidrosolubles de México, S.A. de C.V.** garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a las especificaciones de la etiqueta. Dado a que el uso del producto está fuera de su control, no se da garantía expresa ni implícita sobre los resultados y/o efectos inherentes a su uso, tanto si se utiliza o no bajo las indicaciones recomendadas. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del producto.