

FICHA TÉCNICA

MALVADOR C.T. 81 P.H.

Metalaxil + Clorotalonil
Polvo humectable

COMPOSICIÓN

Metalaxil no menos de 9% en peso.

Clorotalonil no menos de 72% en peso.

REGISTRO COFEPRIS:

RSCO-MEZC-1311-305-002-081

FUNCIÓN

MALVADOR C.T. 81 P.H. es una mezcla de fungicidas con diferentes modos de acción, el metalaxil es un fungicida sistémico y el clorotalonil es un fungicida de contacto, para el control de tizón tardío en los cultivos abajo indicados.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	Estándar
APARIENCIA	Polvo fino homogéneo
COLOR	Blanco-grisáceo
pH	5.0 - 8.0

USO EN CULTIVOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Jitomate (7) Pepino (7)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 - 3.0	Inicie las aplicaciones cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de las enfermedades. Para el caso de pudrición del tubérculo, se recomienda una aplicación durante la floración y otra 7 días después. No hacer más de 3 aplicaciones por temporada. Bajo condiciones severas de presión de la enfermedad intercalar aplicaciones de productos de contacto cada 7 días.



MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Siempre utilice su equipo de protección personal. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua. Abrir la bolsa de aluminio cortando la parte superior de la misma, colocar en el tanque la dosis recomendada, completar hasta su capacidad y mantener en constante agitación. Se recomienda usar un equipo con bomba capaz de mantener 35 a 40 libras de presión en las boquillas para proveer suficiente agitación en el tanque y de esta forma mantener la mezcla en suspensión. Durante el llenado del tanque use un cedazo para evitar taponamiento de boquillas, por posibles contaminantes. No destapar la boquilla con la boca. La mezcla deberá ser aplicada el mismo día. Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr el cubrimiento completo del follaje, según se emplee equipo terrestre o aéreo. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos, solo se podrán hacer mezclas con productos que tengan registros vigentes en los cultivos recomendados.

FITOTOXICIDAD

Este producto no es fitotóxico a los cultivos y en las dosis aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

